


A Z

J P

AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde

urologie

blaasspoelingen | preventie nieuwe blaaspoliepen



BLAASPOLIEPEN

Uit onderzoeken bleek dat u een of meerdere oppervlakkige blaasgezwellen heeft. De uroloog stelde u een blaasspoeling voor als behandeling.

Blaaspoliepen die zich enkel beperken tot het oppervlakkige slijmvlies zijn in principe niet kwaadaardig. In meer dan 50% van de gevallen kunnen blaaspoliepen terugkeren op andere plaatsen en in de loop van de tijd evolueren tot kwaadaardige gezwellen.

Een preventieve nabehandeling met een of meerdere blaasspoelingen helpt de kans te verkleinen dat deze poliepen terugkomen.

SPOELMIDDELEN

In functie van een aantal parameters zoals het aantal poliepen, diepte van de ingroei, recidiverende karakter, ... wordt een keuze gemaakt met welk spoelmiddel u behandeld zal worden (low, medium en high risk groep). De uroloog bespreekt vooraf met u welk middel in uw situatie het beste is en hoeveel spoelingen nodig zijn.

BCG-SPOELINGEN

BCG is een tuberculosevaccin met antitumorale eigenschappen door middel van een immuniserend proces. Dit product wordt meestal gestart bij poliepen met een agressiever profiel.

De behandeling start ongeveer twee weken na de blaaspoliepverwijdering. Gedurende zes weken wordt wekelijks een spoeling gegeven. Naderhand wordt vaak een controlebiopt genomen. Is de behandeling succesvol wordt een onderhoudsschema opgestart dat minstens één jaar, maar liefst drie jaar moet volgehouden worden.

MITOMYCINE-C-SPOELINGEN

Dit is een antibioticum met antitumorale eigenschappen. Dit product kan het risico op nieuwe tumoren helpen beperken, maar kan ook soms kleine tumoren doen verdwijnen (chemoresectie).

De behandeling start twee weken na de blaaspoliepverwijdering. Gedurende zes weken wordt wekelijks een spoeling gegeven.

Is de behandeling succesvol wordt een onderhoudsschema opgestart. Hierbij wordt gedurende zes tot twaalf maanden maandelijks een aanvullende blaasspoeling gegeven.


DE BEHANDELING

VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat u voor de blaasspoeling niet drinkt gedurende drie à vier uren, om zo een mogelijke verdunning van het blaasspoelingsproduct te vermijden alsook de urineproductie dermate te beperken. U moet namelijk het product gedurende langere tijd in uw blaas ophouden. Tracht eveneens zo kort mogelijk voor de aanvang van de behandeling uw blaas nog volledig leeg te plassen.

DE PROCEDURE

De behandeling bestaat uit het plaatsen van een blaassonde. Eerst wordt de blaas gelegegd met een katheter. Daarna wordt het product door middel van de blaassonde in uw blaas gebracht. Vervolgens wordt de blaassonde verwijderd en moet geprobeerd worden het product gedurende minimum een uur in uw blaas te houden. De spoeling heeft anders onvoldoende effect.



Na de blaasspoeling moet u zoveel mogelijk van positie veranderen (wandelen, liggen, ...) zodanig dat het product in contact komt met de volledige blaaswand en zo optimaal mogelijk te kunnen inwerken.

NAZORG

Meestal wordt na verloop van een of twee uren, afhankelijk van het product, de vloeistof gewoon uitgeplast. Help dit natuurlijk proces door heel veel water te drinken na afloop van de behandeling.

Contact met het product kan mogelijk huidirritatie veroorzaken. Drink daarom gedurende de eerste zes uren na de blaasspoeling veel water.

Zowel mannen als vrouwen wordt aangeraden om bij het eerste toiletbezoek na de spoeling zittend te urineren om zo urinespatten te vermijden. Was tevens uw handen en geslachtsdelen grondig na het urineren. Giet na het plassen twee kopjes bleekwater in de toiletpot en laat dit gedurende een kwartier inwerken alvorens door te spoelen. Spoel het toilet goed door met gesloten deksel om spatten te voorkomen.

SEKSUELE BETREKKINGEN

Gedurende de eerste week na een blaasspoeling wordt aangeraden een condoom te gebruiken bij seksuele betrekkingen. Vrouwen van vruchtbare leeftijd moeten tijdens de ganse duur van de behandeling steeds een voorbehoedsmiddel gebruiken.

CONTROLE

Na het afwerken van het blaasspoelschema zal er op regelmatige tijdstippen een controle moeten gebeuren. In functie van het behandelingschema kan dit door een cystoscopie of een nieuwe controlebiopsie.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

KLASSIEKE VERWIKKELINGEN

Bijwerkingen zoals dikwijls, branderig, moeilijk of bloederig plassen, komen vaak voor en verdwijnen meestal spontaan. Heel veel water drinken kan helpen om deze symptomen sneller te laten verdwijnen.

Andere regelmatig voorkomende problemen bij een BCG-spoeling zijn koorts, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn en spierpijn. De remedie is rusten, veel drinken en eventueel een pijnstiller of koortswerend middel innemen. Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen verdwenen op de dag na de spoeling.

Indien de bijwerkingen langer dan twee dagen aanhouden raadpleegt u best de behandelend arts.

Bij uw volgende afspraak meldt u best alle doorgemaakte bijwerkingen. Soms zal een van de behandelingen om veiligheidsredenen met een week uitgesteld worden.

ZELDZAME BIJWERKINGEN

De volgende verwikkelingen komen slechts zelden voor, maar dienen dringend te behandeld worden.

- Koorts hoger dan 39,5° C
- Rillingen, een algemeen griepig gevoel
- Aanhoudende gewrichtspijnen
- Kortademigheid
- Veralgemeende jeuk, netelroos

Dit zijn mogelijke tekens van een urineweginfectie of van een algemene allergische reactie die dringend moeten behandeld worden.

TOT SLOT

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie aanvullend op de gesprekken met de behandelend uroloog.

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding tot wijzigingen geven. Dit zal altijd door de uroloog kenbaar worden gemaakt.

Mocht u na het lezen van deze patiëntenfolder nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de arts of aan het zorgteam van de verpleegafdeling.

Referentie | Folder BAU: Nabehandeling van oppervlakkige blaasge-
zwellen met BCG of Mitomycine-C

VERPLEEGAFDELING HEELKUNDE 1 | T 02 257 57 60

CONSULTATIES AZ JAN PORTAELS | T 02 257 51 73

PREOPERATIEVE CONSULTATIES | T 02 257 54 44

Consultatie privé | T 02 253 31 33

Grote markt 21, 1800 Vilvoorde
Nieuwelaan 63, 1860 Meise

Consultatie MCH | T 02 785 03 45
Hardlaan 69, 1970 Wezenbeek-Oppem

MITOMYCINE 40mg

Spoeling	Datum	Opmerkingen	Cystoscopie/PAP
Week 3			
Week 4			
Week 5			
Week 6			
Week 7			
Week 8			
Maand 3			Cystoscopie / PAP
Maand 4			
Maand 5			
Maand 6			Cystoscopie / PAP
Maand 7			
Maand 8			
Maand 9			Cystoscopie / PAP
Maand 10			
Maand 11			
Maand 12			Cystoscopie / PAP
Datum TURBI			
APO	Ta T1	G1 G2 G3	CIS: ja / nee
	Solitair Multipel	< 3cm >3cm	
Datum recidief: _____			

BCG matig risico			
Spoeling	Datum	Opmerkingen	Cystoscopie/PAP
Week 3			
Week 4			
Week 5			
Week 6			
Week 7			
Week 8			
Maand 3-1			Cystoscopie / PAP
Maand 3-2			
Maand 3-3			
Maand 6-1			Cystoscopie / PAP
Maand 6-2			
Maand 6-3			
Maand 9			Cystoscopie / PAP
Maand 12-1			Cystoscopie / PAP
Maand 12-2			
Maand 12-3			
Datum TURBI			
APO	Ta T1	G1 G2 G3	CIS: ja / nee
	Solitair Multipel	< 3cm >3cm	
Datum recidief:			

BCG hoog risico (1/2)			
Spoeling	Datum	Opmerkingen	Cystoscopie/PAP
Week 3			
Week 4			
Week 5			
Week 6			
Week 7			
Week 8			
Week 10			Controle biopsie
Maand 3-1			
Maand 3-2			
Maand 3-3			
Maand 6-1			Cystoscopie / PAP
Maand 6-2			
Maand 6-3			
Maand 9-1			Cystoscopie / PAP
Maand 9-2			
Maand 9-3			
Maand 12-1			Cystoscopie / PAP
Maand 12-2			
Maand 12-3			
Datum TURBI			
APO	Ta T1	G1 G2 G3	CIS: ja / nee
	Solitair Multipel	< 3cm >3cm	
Datum recidief:			

BCG hoog risico (2/2)

Spoeling	Datum	Opmerkingen	Cystoscopie/PAP
Maand 15			Cystoscopie/ PAP
Maand 18-1			Cystoscopie / PAP
Maand 18-2			
Maand 18-3			
Maand 21			Cystoscopie / PAP
Maand 24-1			Cystoscopie / PAP
Maand 24-2			
Maand 24-3			
Maand 27			Cystoscopie / PAP
Maand 30-1			Cystoscopie / PAP
Maand 30-2			
Maand 30-3			
Maand 33			Cystoscopie / PAP
Maand 36-1			Cystoscopie / PAP
Maand 36-2			
Maand 36-3			



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be