

# Wanneer stoppen met bloedverdunners/ wanneer vervangen

Asaflow		
niet stoppen		
Plavix (Clopidogrel) Brilique (Ticagrelor)	niet stoppen bij laag risico procedure**	vervangen door Asaflow 160mg
7 dagen stoppen		
Ticlid (Ticlopedine) Efiënt (Prasugrel)	niet stoppen bij <u>laag risico procedure</u> **	vervangen door Asaflow 160mg
10 dagen stoppen		
Xarelto (Rivaroxaban) Eliquis (Apixaban) Lixiana ( Edoxaban)	24 uren stoppen bij <u>laag risico procedure</u> **	
48 uren stoppen		
Pradaxa (Dabigatran)	24 tot 48 uren stoppen bij <u>laag risico procedure</u> **	
48 tot 96 uren stoppen, afhankelijk van de nierfunctie		
Sintrom		vervangen door LMWH* cfr huisarts
4 dagen stoppen		
Marcoumar		vervangen door LMWH* cfr huisarts
10 dagen stoppen		
Marevan		vervangen door LMWH* cfr huisarts
7 dagen stoppen		
Fraxiparine 0,4/ Clexane 40/ Innohep 0,35		
12 uren stoppen, cfr nierfunctie		
Fraxiparine > 0,4*/ Clexane > 40*/ Innohep>of= 0,45/ Fraxodi		
24 uren stoppen, cfr nierfunctie		

\*\*facetten lumbaal/thoracaal  
SIG infiltratie  
perifere zenuwbloks