

Behandeling met
doelgerichte therapie
Atezolizumab
(Tecentriq®)



VEILIGE ZORG

AZ JAN PORTAELS

Inhoudsopgave

Antikankertherapie vandaag	p.3
Hoe werkt ons immuunsysteem?	p.4
Wat maakt immunotherapie anders?	p.5
Immunotherapie en nevenwerkingen?	p.4
Nevenwerkingen tijdig melden en bespreken	p.6
Nevenwerkingen aanpakken	p.8
Contact opnemen bij problemen	p.12
Immunotherapie in het dagelijkse leven	p.13
Een dag op de afdeling	p.20
Jouw therapie: Atezolizumab (Tecentriq®)	p.21
We staan voor je klaar	p.22

Antikankertherapie vandaag

Een behandeling bij kanker is altijd een behandeling op maat. De keuze van de behandeling is afhankelijk van verschillende factoren:

- Het type kanker
- De uitgebreidheid van de ziekte
- Het bestaan van andere ziekten
- De algemene toestand van de persoon
- ...

Er zijn verschillende opties voor de behandeling van kanker. De behandeling bestaat vaak uit verschillende therapieën die tegelijk of opeenvolgend worden toegepast.

- Chirurgie
- Radiotherapie
- Chemotherapie: deze medicijnen worden via de mond of via een infuus toegediend en beletten de vermenigvuldiging van de kankercellen. Daardoor kunnen ze de kanker vernietigen of de groei ervan afremmen. Gezonde cellen doen echter ook aan celdeling en de chemotherapie treft daarom helaas ook deze gezonde cellen. Hierdoor kunnen nevenwerkingen ontstaan.

- Doelgerichte therapie: celremmende geneesmiddelen die, in tegenstelling tot chemotherapie, doelgericht de abnormale cellen doden of hun groei remmen. Ook bij deze behandeling kunnen zich nevenwerkingen voordoen.
- Anti-hormonale therapie: bij sommige kankers spelen hormonen een rol: de hormonen stimuleren de groei van de kanker. Anti-hormonale therapie wordt dan gegeven om de aanmaak en/of de werking van de eigen hormonen af te remmen. Daardoor wordt voorkomen dat kankercellen een nieuwe prikkel krijgen om te groeien.
- **Immunotherapie:** behandelingen met immunotherapie stimuleren de eigen weerstand om de kankercellen aan te vallen en op te ruimen. Ook immunotherapie kan nevenwerkingen veroorzaken, vooral dan door het stimuleren van het eigen immuunsysteem. Je leest er alles over in [deze brochure](#).

Hoe werkt ons immuunsysteem?

Het immuunsysteem ('onze weerstand') is het verdedigingssysteem van ons lichaam. Wanneer ons lichaam geconfronteerd wordt met aanvallen van de buitenwereld (bijvoorbeeld een virus of bacterie), activeert het lichaam het immuunsysteem en komt een verdedigingsreactie op gang. In die verdedigingsreactie spelen verschillende witte bloedcellen een belangrijke rol: zij zullen het virus of de bacterie opsporen en proberen te vernietigen.

Het immuunsysteem beschermt ons op die manier niet alleen tegen virussen of bacteriën, maar kan ons ook beschermen tegen het ontstaan van kanker. Ons immuunsysteem spoort kwaadaardige cellen meestal tijdig op en maakt ze onschadelijk.

Niet altijd slaagt het immuunsysteem erin de kankercellen te vernietigen. Dat komt omdat sommige kankercellen manieren hebben gevonden om aan het immuunsysteem te ontsnappen:

- Soms slagen kankercellen erin om de activiteit van de witte bloedcellen te verminderen. Het immuunsysteem wordt door de kankercellen verzwakt en slaagt er niet in om de kankercellen te vernietigen.
- Soms zenden kankercellen een signaal uit waardoor het immuunsysteem misleid wordt en het de kanker cel voor een gezonde cel houdt. Het immuunsysteem laat de kankercellen bijgevolg ongemoeid verder groeien



Wat maakt immunotherapie anders?

Een behandeling met chemotherapie heeft een onmiddellijk effect: de kwaadaardige cellen worden meteen zoveel mogelijk vernietigd.

Later + langer effect. Immunotherapie leert het immuunsysteem om kwaadaardige cellen beter te herkennen en aan te vallen. Het kan daardoor langer duren (soms weken tot maanden) alvorens de behandeling zijn effect bereikt. Tegelijk kan het effect van immunotherapie ook langer aanhouden, tot lang na de toediening van de behandeling: het immuunsysteem heeft immers bijgeleerd en kan de kankercellen daardoor ook na de behandeling blijven bestrijden.

Immunotherapie en nevenwerkingen

Omdat immunotherapie op een andere manier werkt, heeft deze behandeling ook andere nevenwerkingen dan chemotherapie.

De ongewenste gevolgen zijn vaak te wijten aan een te sterke immuunreactie. Meestal doen ze zich voor tijdens de behandeling, maar ze kunnen ook tot maanden na het einde van de behandeling ontstaan.

Het tijdig en correct opmerken van nevenwerkingen die ontstaan ten gevolge van immunotherapie is heel belangrijk. Door je klachten goed op te volgen, heb je sneller in de gaten wanneer nieuwe klachten optreden en wanneer het zinvol of zelfs noodzakelijk is je zorgverleners te raadplegen.

Een mogelijke “(auto-)immunoreactie” of overstimulatie van het immuunsysteem moet immers tijdig vastgesteld worden. Het opvolgen van je klachten helpt je bovendien ook om de arts en verpleegkundige te vertellen welke nevenwerkingen je hebt.

Nevenwerkingen tijdig melden en bespreken

De behandeling met immunotherapie wil het immuunsysteem stimuleren om zo de kankercellen beter te bestrijden. Soms gebeurt het dat de therapie het immuunsysteem zodanig stimuleert dat het niet alleen de kankercellen, maar ook het eigen lichaam aanvalt. Bepaalde organen (bijvoorbeeld de lever, longen, darmen, huid en klieren) kunnen daardoor “ontstoken” geraken. We spreken dan van een “(auto-)immunoreactie”. Die reacties kunnen zich uiten onder de vorm van klachten die onschuldig lijken, zoals jeuk, buikpijn en diarree.

Er wordt regelmatig een bloedafname en een klinisch onderzoek gedaan om zo’n reactie tijdig vast te stellen. Dat gebeurt niet alleen tijdens de behandeling, maar tot enkele maanden nadien. Net zoals het effect op de kanker soms pas later optreedt, kunnen ook deze klachten pas weken of maanden na de laatste toediening optreden.

Tijdig reageren helpt om de immunoreactie correct te kunnen behandelen en te voorkomen dat een immunoreactie tot ernstige complicaties leidt.

Neem bij volgende klachten meteen contact op met uw zorgverleners in het ziekenhuis en wacht nooit tot een volgend ziekenhuisbezoek om ze te melden:



diarree of buikloop
bloed in de ontlasting
meer of minder plassen
donkere urine



kortademigheid
hoesten



hoofdpijn
buijkpijn
pijn ter hoogte van de lever (rechts van de maagstreek)
pijnlijke of gezwollen gewrichten



huiduitslag
jeuk
geel worden van de huid



wgeel worden van het oogwit
slecht zien



vermoeidheid
lusteloosheid
spierzwakte
sufheid



gewichtsverandering (zonder meer of minder eten)
gewichtsverlies ondanks méér eetlust



extreme dorst



veranderde stemming
gedeprimeerd
sneller geïrriteerd
opvliegend zijn

Nevenwerkingen aanpakken

Sommige mensen hebben meer last van bijwerkingen, anderen merken er bijna niets van. In tegenstelling tot chemotherapie, ervaren mensen doorgaan minder nevenwerkingen tijdens een behandeling met immunotherapie. Laat je niet beïnvloeden door verhalen van anderen. Iedereen reageert anders op een behandeling en iedere therapie is verschillend. Bovendien heeft de ernst van de bijwerkingen niets te maken met het effect van de behandeling.

Verder in deze brochure gaan we in op de meest voorkomende bijwerkingen:

- buikloop of diarree
- huidveranderingen
- misselijkheid en verminderde eetlust
- ongewone vermoeidheid
- spierpijn en gewrichtspijn

Buikloop of diarree

Een behandeling met immunotherapie kan een ontstekingsreactie geven in de darmen. Daardoor kan je last krijgen van diarree. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor diarree, zoals darm-infecties en stress, maar steeds moet een auto-immunreactie uitgesloten worden.

Tips:

- drink voldoende (1,5 tot 2 liter per dag)
 - ☒ thee, rijstwater, wortelsap en bosbessensap zijn goed
 - ☒ vermijd koffie en te koude of te warme dranken
- pas je voeding aan
 - ☒ vermijd sterk gekruide voeding
 - ☒ eet geen peperkoek
 - ☒ vermijd vezelrijk fruit (citrus, kiwi, pruimen), noten, rauwkost en gedroogd fruit
- wees zacht voor je huid en gebruik zacht toiletpapier
- bespreek met de arts of je medicatie kan nemen

Huidveranderingen

De behandeling kan je huid droger en/of schilferig maken. Dat kan gepaard gaan met jeuk. Soms kan zich een huidreactie onder de vorm van huiduitslag (rash) voordoen. Het kan ook gebeuren dat de huid door de immunotherapie bleker wordt of witte vlekken vertoont. Ook je haarkleur kan lichter worden. In tegenstelling tot chemotherapie geeft immunotherapie geen haarverlies, maar je haar kan wel dunner worden.

Gedurende de behandeling kan je huid ook gevoeliger zijn voor zonlicht.

Tips:

- draag extra zorg voor je huid en voorkom uitdroging
- vermijd blootstelling aan de zon
- bescherm je huid tegen irritatie en verwondingen

Misselijkheid en verminderde eetlust

Als reactie op de behandeling is het mogelijk dat je misselijke bent, minder eetlust hebt of een zwaar gevoel op de maag hebt. Die klachten verschillen van persoon tot persoon, zelfs als die personen dezelfde therapie krijgen. Laat je dus niet bang maken door enge verhalen hierover.

Wees ook niet ongerust als je geen last hebt van deze klachten. Het betekent niet dat de behandeling bij jou niet aanslaat. Deze klachten staan los van het effect van de therapie.

Tips:

- drink voldoende
- aarzel niet medicatie tegen misselijkheid in te nemen
- eet regelmatig een kleine maaltijd of tussendoortje

Ongewone vermoeidheid

Veel mensen die behandeld worden met immunotherapie krijgen last van vermoeidheid. Het kan dan zijn dat je je moe voelt terwijl je niet echt een (grote) inspanning hebt gedaan.

Vaak voelen mensen zich niet alleen lichamelijk vermoeid, maar ook mentaal of emotioneel. Vermoeidheid is geen banale klacht. Door vermoeidheid kan je mogelijk je dagen niet invullen zoals je zou willen, of kan je veel minder dan wat je gewoon bent. Dat kan gevoelens van frustratie, woede, teleurstelling of verdriet met zich meebrengen.

Bij sommige mensen vertoont die vermoeidheid een herkenbaar, terugkerend patroon, dat samenhangt met de toedieningen van chemotherapie en de herstelperiodes tussenin. Bij anderen komt de vermoeidheid eerder onvoorspelbaar opzetten. Het valt niet makkelijk te voorspellen vanaf wanneer vermoeidheid optreedt. Veel mensen krijgen hier al vroeg in hun behandeling last van. Bij anderen wordt vermoeidheid pas echt voelbaar wanneer de behandeling vordert.

Ook na de behandeling houdt de vermoeidheid vaak nog enige

tijd aan. Het is niet abnormaal dat je nog last hebt van vermoeidheid enkele maanden na het stopzetten van de therapie. Soms kan enige mate van vermoeidheid nog verschillende jaren na de therapie duren.

Tips:

- zorg voor voldoende rust
- zorg ook voor voldoende beweging, actief zijn kan de vermoeidheid tijdens en na de behandeling verminderen
- luister naar je lichaam
- zorg voor ontspanning
- vraag hulp om zelf wat energie te sparen
- pak onderliggende problemen aan (vb: slapeloosheid, verminderde eetlust)

Het revalidatieprogramma van het AZ Jan Portaels, SWInG, biedt je de mogelijkheid om tijdens of na je behandeling in groep en onder professionele begeleiding te werken aan je herstel.

Spierspijn en gewrichtspijn

Door immunotherapie kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat je last krijgt van spierspijn en gewrichtspijn. Het kan zijn dat je gewrichten en/of spieren stijf aanvoelen of dat je spierkrampen krijgt.

Tips:

- zorg voor schoenen en kledij waar je je comfortabel kunt in bewegen.
- een goede lichaamshouding zorgt ervoor dat spieren en gewrichten zich soepel van elkaar blijven bewegen.
- als je last hebt van deze symptomen, mag je paracetamol innemen
- warmte kan voor verlichting van pijnlijke gewrichten zorgen.
- spieren en gewrichten hebben rust nodig maar toch is het belangrijk om te blijven bewegen

Hoe contact opnemen bij problemen?

De huisarts

Dagziekenhuis: werkdagen van 8u tot 16u
02/ 257 58 80

Inwendige geneeskunde 1: avonden, weekend- en feestdagen
02/ 257 57 20

Spoedgevallen: avonden, weekend- en feestdagen
02/ 257 56 80



Immunotherapie in het dagelijkse leven

Mag je tijdens de behandeling alles blijven doen zoals je dat gewoon bent? We geven je graag wat advies over wat je veilig kan doen en over wat je beter anders aanpakt of niet doet tijdens de behandeling.

Voeding

(Gezonde) voeding is belangrijk voor iedereen, maar bij de behandeling van kanker speelt voeding een nog grotere rol. Bij een goede voedingstoestand en met name een stabiel lichaamsgewicht is de behandeling doorgaans beter draaglijk. Bovendien houdt een goede voedingstoestand uw weerstand op peil. Als er bepaalde voedingsproducten verboden zijn tijdens je behandeling, zal de arts of verpleegkundige je dat vertellen.

Tips:

- melk en melkproducten, vlees en peulvruchten bevatten veel eiwitten.
- vers geschild fruit en groenten (rauw, indien goed gewassen of gekookt) zijn een bron van vitamines.
- volkorenbrood en zilvervliesrijst bevatten allerlei mineralen, en ook eiwitten en vezels.
- zorg ervoor dat je voldoende drinkt (minimaal 1.5 liter per dag)

Algemene Hygiëne

Een goede hygiëne is belangrijk om infecties te vermijden. Een belangrijk onderdeel van de dagelijkse hygiëne is een goede hand- en mondhygiëne. Je handen wassen doe je het best verschillende keren per dag, zeker voor het eten en na het toiletbezoek. Poets je tanden minstens tweemaal per dag, liefst na elke maaltijd en zeker vóór het slapengaan.

Alcohol

Zowel alcohol als geneesmiddelen worden afgebroken in de lever. Gebruik alcohol met mate.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is altijd een goede beslissing. Je lichaam krijgt tijdens de therapie immers krachtige geneesmiddelen te verwerken. Door andere schadelijke stoffen zoals tabak te vermijden, voorkom je dat de effecten van de therapie kunnen worden beïnvloed.

Andere geneesmiddelen en behandelingen

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van de therapie beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat je jouw arts vertelt welke geneesmiddelen, vitaminen, voedingssupplementen, homeopathische middelen, plantenextracten enzovoort je gebruikt.

Het is nuttig deze geneesmiddelen mee te brengen en te tonen aan de arts, liefst in hun originele verpakking en zo mogelijk met de bijsluiter. Ook een vaccinatie, bijvoorbeeld het griepvaccin, moet je steeds met je behandelende arts bespreken

Seksualiteit

Je behandeling met immunotherapie vormt geen bezwaar om te vrijen. Wel is het belangrijk om tijdens je behandeling en tot enkele maanden nadien voorbehoedsmiddelen (bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken. Een mogelijke zwangerschap moet nu voorkomen worden omdat de effecten van immunotherapie op de zwangerschap en de baby onvoldoende gekend zijn.

Het bespreekbaar maken van seksuele problemen, zorgen of vragen is belangrijk, maar niet zo evident. Door erover te praten met je partner leer je elkaar beter begrijpen en ontdekken jullie samen op welke manier jullie seksualiteit en intimiteit in deze periode willen beleven.

Met vragen rond seksualiteit kan je steeds terecht bij onze seksuoloog.

Een voertuig besturen / verplaatsing naar het ziekenhuis

Of je gedurende een behandeling met immunotherapie een auto mag en kan besturen, hangt af van verschillende factoren: je behandeling zelf, de ondersteunende medicatie, je algemene toestand, ... Meestal vormt met de wagen rijden tijdens immunotherapie geen probleem.

Het is echter raadzaam om bij de eerste toediening te zorgen dat je je laat brengen en halen. Het is immers moeilijk in te schatten hoe je lichaam op de therapie zal reageren. Als je geen problemen zoals extreme vermoeidheid, concentratieproblemen enzovoort ondervindt, kun je samen met je zorgverleners inschatten of je in staat bent om veilig met de auto te rijden.

Werk en andere activiteiten

Meestal kunnen mensen die behandeld worden met immunotherapie hun dagelijkse activiteiten, zoals huishouden, hobby's en sport gewoon verderzetten. Het verderzetten van je professionele activiteiten hangt af van hoe je je voelt, de aard van je werk, de afspraken met je werkgever enzovoort.

Bespreek met je behandelende arts of je aan het werk kan blijven.

Thuis omgaan met afvalstoffen van de therapie

Zoals met alle geneesmiddelen kunnen resten van je behandeling worden uitgescheiden langs de lichaamsvochten (zoals urine). Voor immunotherapie zijn er geen schadelijke effecten bekend voor de mensen in je omgeving. In het ziekenhuis gebruiken we onderstaande tips uit voorzorg. Als je wil, kan je daar thuis ook rekening mee houden.

Tips:

- plas altijd zittend op het toilet om spatten te voorkomen.
- spoel het toilet altijd tweemaal door met gesloten deksel.
- was je handen grondig na gebruik van het toilet.
- wees voorzichtig met het opruimen van braaksel. Doe dat zo nodig met handschoenen aan.

Erover praten met (klein)kinderen

Voor de kinderen in je gezin is het beter dat het leven zoveel mogelijk zijn gangetje gaat. Naar school gaan, hobby's, sportactiviteiten, culturele activiteiten... dat kan allemaal in de mate van het mogelijke gewoon verdergaan.

Het is normaal dat je als (groot)ouder je (klein)kinderen wil beschermen tegen moeilijke, pijnlijke ervaringen. Ervaring leert ons echter dat het beter is kinderen toch te betrekken en hen informatie te geven aangepast aan hun leeftijd. Je kan kort vertellen hoe jij je voelt en hoe je tegen de behandeling aankijkt en wat de behandeling inhoudt. Kinderen begrijpen dan beter hoe jij reageert of wat je doormaakt.

Er is op de afdeling heel wat materiaal voorhanden, vraag er gerust naar!

Huisdieren verzorgen

Een huisdier houden in de periode dat je immunotherapie krijgt, is mogelijk.

Een geliefd huisdier kan in deze periode net een steun en toeverlaat betekenen. Als je huisdier goed verzorgd is, kan je gerust de verzorging van je huisdier verder opnemen.

Tips:

- vermijd krab- en bijtletsels. Vijl eventueel ter preventie de nagels van je huisdier bij.
- vermijd het zelf reinigen van huisdierenverblijven en kattentoiletten. Als je dit toch doet, draag je het best handschoenen en was je nadien je handen.
- zorg dat het kattentoilet zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de ruimte waarin je maaltijden bereidt of eet.
- laat je niet likken in het aangezicht en was je handen na elk contact met je huisdier. Slaap niet samen met je huisdier.
- sommige huisdieren dragen meer ziektekiemen met zich mee en vormen dus ook een hoger risico voor patiënten. Het gaat om reptielen (slangen, schildpadden ...), kippen, eenden en knaagdieren. Verzorging en contact worden het best vermeden.

Reizen

Als je behandelingschema het toelaat en als je jezelf in staat voelt om te reizen, dan is reizen zeker mogelijk. Het kan je weer energie en moed geven en heilzaam zijn. Doe het altijd in overleg met je behandelende arts.

Tips:

- breng je behandelende arts op de hoogte van je reisplannen.
- krijg je een uitkering van het ziekenfonds, dan moet de adviseerend geneesheer toestemming geven om naar het buitenland op vakantie te gaan.

- zorg ervoor dat je goed verzekerd bent: vraag je Europese ziekteverzekeringskaart aan, bekijk je verzekeringsvoorwaarden en zorg voor een goede annulatieverzekering. Zorg dat je op de hoogte bent van wat je annulatieverzekering inhoudt.
- ga naar een bestemming waar goede medische zorg in de nabijheid is. Neem een medisch verslag mee. Neem eventueel op voorhand al eens contact op.

Zonnebaden

Tijdens een behandeling met immunotherapie vermijd je het best zoveel mogelijk blootstelling aan de zon.

Tips:

- gebruik een beschermende zonnecrème met voldoende hoge factor en bescherming tegen UVA- en UVB-stralen. Vooral voldoende en frequent insmeren is belangrijk!
- vermijd zo mogelijk de zon op de warmste uren, tijdens de middag.
- draag beschermende kledij: lange broek, lange mouwen, hoedje, petje, T-shirt.
- geef de voorkeur aan schaduw.
- wees alert dat je achter glas ook kan verbranden.
- gebruik van een zonnebank is altijd afgeraden.

Sauna, massage en wellness

Het bezoek aan een hygiënisch wellnesscentrum, een massage, een sauna of een jacuzzi kunnen je helpen ontspanning te vinden en zijn in de regel niet verboden. Wel is het goed dit na te vragen bij je behandelende arts. Soms kan het beter zijn dat je extreme warmte mijdt, bijvoorbeeld als je lymfoedeem hebt.

Ook bij een massage is het belangrijk dat je je massagetherapeut op de hoogte stelt van je gezondheidssituatie.

Fysieke beweging en sporten

Fysieke beweging biedt ook tijdens een antikankertherapie voordelen: het onderhoudt je fysieke conditie, is goed voor je hart en bloedvaten, kan vermoeidheid verminderen en is ook goed voor je mentale gezondheid.

Tips:

- zorg voor een goede uitrusting.
- regelmatig, een aantal keren per week, een half uur sporten is beter dan één keer intensief.
- bepaal steeds zelf het tempo en het soort inspanning.
- zorg voor een opwarming vooraf en afkoeling nadien.
- drink voldoende tijdens en na de fysieke activiteit.
- bouw langzaam op, forceer niets.

Zwemmen

Over het algemeen mag je tijdens een behandeling met immunotherapie zwemmen.

Zwemmen is een sport waarbij je geen last hebt van zwaartekracht en waarbij je lichaam geen schokken te verwerken krijgt. Je kan je bovendien heel erg aanpassen aan je eigen tempo en mogelijkheden.

In sommige gevallen is zwemmen echter (tijdelijk) niet aangewezen. Bijvoorbeeld tot een zestal weken na het plaatsen van een poortkatheter of operatie. Twijfel je of je al dan niet mag zwemmen, vraag dan advies aan je zorgverleners.

Een dag op de afdeling

Je wordt op de dag van afspraak 's morgens verwacht op onze afdeling op de vierde verdieping. Je mag thuis ontbijten, tenzij de arts dit anders gevraagd heeft.

Bij de aanvang van de behandeling word je gemeten en voor elke chemotherapie word je gewogen. Dat is nodig om de correcte dosis te bepalen. De verantwoordelijke verpleegkundige zal je vertellen welke kamer voor jou voorzien is. We hebben kamers van 1 of 2 personen.

Een verpleegkundige komt langs om je temperatuur en bloeddruk te controleren, een bloedname te doen en een spoelinfuus te starten. Heb je vragen, dan worden die graag beantwoord.

Nadien komt ook de arts even langs om de resultaten te bespreken. Heb je vragen voor de arts, stel ze dan gerust.

Ben je 's middags nog niet klaar met de behandeling, dan krijg je van ons een broodmaaltijd met soep.

Je mag een begeleider meebrengen. We vragen wel het aantal bezoekers te beperken om de rust en privacy van alle patiënten te garanderen.

Tips:

- parkeren kan gratis op parking "Kito", tegenover het politiekantoor, naast de school Kito. Je neemt een ticket bij het binnenrijden en laat dit afstempelen op de afdeling. Met het afgestempelde ticket kan je een uitrijkaartje krijgen aan het onthaal.
- meld je elke keer voor je naar de afdeling komt aan op de dienst inschrijvingen op de gelijkvloerse verdieping
- indien u een speciaal dieet volgt, weten wij dat graag. Zo kunnen we voor jou een aangepast middagmaal voorzien
- **ben je allergisch voor iets, meld het ons dan zeker!**

Uw therapie: Atezolizumab (Tecentriq®)

Hoe verloopt de therapie?

Eén cyclus duurt drie weken (21 dagen) en omvat één opname voor immunotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merksnaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-21	
Atezolizumab	Tecentriq®	x	rust	Infuus over 60 minuten

Waar wordt de therapie toegediend?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

Aandachtspunten bij Atezolizumab (Tecentriq®)

Een infuusreactie doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent.

Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren.

Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.



We staan voor je klaar...

Tal van zorgverleners staan voor je klaar in ons ziekenhuis! Spreek ons gerust aan of vraag naar een van de zorgverleners, we helpen je graag verder.

Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

