

AANVRAAGBON PIJNTHERAPIE AZJP Vilvoorde



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde

Vignet

Naam:

Geboortedatum:

DATUM AANVRAAG: ___/___/20___

| | |
|------------------------------------|--|
| Pijnprobleem/ Pijndiagnose: | |
| Beeldvorming uitgevoerd? | <input type="radio"/> ja: referentiecode bijvoegen a.u.b. <input type="radio"/> nee |
| EMG uitgevoerd? | <input type="radio"/> ja: resultaat bijvoegen a.u.b. <input type="radio"/> nee |

Aangevraagde procedure:

| TECHNIEK | NIVEAU | ZIJDE |
|---|--------|-----------------|
| Transforaminale (TFE) → CT of MRI | | Links Rechts |
| Cervicale epidurale (CEI) → MRI noodzakelijk | | |
| Diagnostisch wortelblok (in voorbereiding op PRF DRG <i>binnen de 3 maanden</i>) → CT of MRI | | Links Rechts |
| Diagnostisch MBB (facetblok in voorbereiding op RF <i>binnen de 3 maanden</i>) | | Links Rechts |
| SIG | | Links Rechts |
| Andere: graag consultatie vooraf | | |

Aandachtspunten:

Bloedverdunners:

- Specificeer:
- Laatste dosis op:
- Vervangen door LMWH:
 - Laatste dosis LMWH op:

→ Richtlijnen zie achterzijde of website AZJP

Andere aandachtspunten:

Wanneer stoppen met bloedverdunners/ wanneer vervangen

| | | |
|--|--|--|
| Asaflow | niet stoppen | |
| Plavix (Clopidogrel) Brilique (Ticagrelor) | 7 dagen stoppen | niet stoppen bij laag risico procedure** vervangen door Asaflow 160mg |
| Ticlid (Ticlopedine) Efiënt (Prasugrel) | 10 dagen stoppen | niet stoppen bij laag risico procedure** vervangen door Asaflow 160mg |
| Xarelto (Rivaroxaban) Eliquis (Apixaban) Lixiana (Edoxaban) | 48 uren stoppen | 24 uren stoppen bij laag risico procedure** |
| Pradaxa (Dabigatran) | 48 tot 96 uren stoppen, afhankelijk van de nierfunctie | 24 tot 48 uren stoppen bij laag risico procedure** |
| Sintrom | 4 dagen stoppen | vervangen door LMWH* cfr huisarts |
| Marcoumar | 10 dagen stoppen | vervangen door LMWH* cfr huisarts |
| Marevan | 7 dagen stoppen | vervangen door LMWH* cfr huisarts |
| Fraxiparine 0,4 / Clexane 40 / Innohep 0,35 | 12 uren stoppen, cfr nierfunctie | **facetten lumbaal/thoracaal SIG infiltratie perifere zenuwbloks |
| Fraxiparine > 0,4* / Clexane > 40* / Innohep > 0,45/ Fraxodi | 24 uren stoppen, cfr nierfunctie | |